

Engene langs Sundsøen og forslag til pleje

Dominante arter generelt

Tagrør, bredbladet dunhammer, manna-sødgræs, grenet pindsvineknop og kær-star på de mest våde arealer.

På de lidt mindre våde områder dominerer kær-star og lyse-siv og på de tørrere arealer dominerer især lyse-siv, almindelig rapgræs, fløjlsgræs og blød-hejre.

Lige her og nu (7/6-2024) fremstår engene meget tilgroede med ovennævnte arter og der sker tillige stor opvækst af træer og buske som især rød-el og grå-pil. Engene fremtræder stedvis særdeles våde, antagelig som følge af den megen nedbør i det sidste halve år.

Udvalgte områder

Jeg har foretaget en beskrivelse af forskellige områder bl.a. ud fra områdernes dominerende arter, men også ud fra områdernes opståen.

Rigkær med butblomstret siv

Det botanisk set mest interessante område ligger lige øst for "Rågeskoven" i et bælte mellem det lyse-siv dominerende område og området med dominans af bredbladet dunhammer tæt på søen. I det pågældende bælte er der præg af kildevæld med stor forekomst af butblomstret siv og med forekomst af bl.a. vinget perikon, tråd-star, næb-star, top-star, eng-forglemmigej, sump-kællingetand, dunet dueurt, vand-mynte, sværtevæld, kær-tidsel, vand-brunrod. Området har stort potentiale som voksested for andre sjældnere planter som fx maj-gøgeurt.

Rigkær med Kær-star

Længere mod syd dominerer kær-star et meget stort område op mod askeskoven. Kær-star dominerer her både på meget våde og mindre våde arealer og danner meterhøje bevoksninger. Der findes dog en del vand-mynte, vandkarse, vinget-perikon og top-star. Der er stor opvækst af rød-el og grå-pil. Området har et stort botanisk potentiale, men det kræver en stor indsats med fældning af de opvoksede træer og buske samt supplerende slåning af vegetationen.

Kildevæld

Helt op mod Sundstien, hvor denne slår et knæk mod SSØ er der opstået et kildevæld, som hæver sig markant over terrænet. Mosfloraen indeholder dog ikke (endnu?) specifikke kildearter. Jeg fandt kun spids spydmos, græsplænumos og almindelig kortkapsel. Der var en del tykbladet ærenpris, håret star, smalbladet mærke samt enkelte vinget perikon og vand-brunrod. Området har stort potentiale, men kommunen er i gang med at lede vandet væk fra kilden af hensyn til Sundstien, som bliver oversvømmet af vandet.

Vandet fra kilden strømmer ud over et areal med dominans af manna-sødgræs, som mod vest og syd går over i et mere afvekslende område med dominans af grenet pindsvineknop og kær-star og forekomst af bl.a. bredbladet dunhammer, tagrør, top-star, knippe-star, kær-tidsel, vand-brunrod,

butbladet skræppe, kruset skræppe, vand-mynte, tykbladet ærenpris, vand-pileurt, lådden-dueurt og sump-kællingetand.

"Overdrevs-knolden"

Midt ude i engen ligger en tør knold. Her dominerer især fløjlsgræs og gul-kløver. Der er en artsrig flora, som dog er præget af tilførsel af gødning, så området kan næppe kaldes overdrev. Af forskellige plantearter kan nævnes Almindelig hundegræs, rød svingel, almindelig rapgræs, eng-rapgræs, draphavre, blød hejre, mose-bunke, almindelig kongepen, mælkebøtte sp., eng-brandbæger, ager-tidsel, almindelig røllike, horse-tidsel, bellis, almindelig hønsetarm, opret hønsetarm, almindelig markarve, hvid-kløver, smalbladet vikke, blød storkenæb, storbægret storkenæb, vild kørvel, lancet-vejbred, lav-ranunkel, ager-snerle og bjerg-ærenpris. Desuden er der opvækst af vedplanter som mirabel, almindelig hvidtjørn, hunde-rose og ask. Den tørre knold græsses normalt hårdt og er samtidig et yndet opholdssted for kreaturerne.

Områder med dominans af lyse-siv

Hvor lyse-siv er altdominerende er der forekomst af bl.a. vand-mynte, lådden dueurt, vand-mynte, kruset-skræppe, vand-pileurt og hjortetrøst.

Naturpleje

Generelt har engene langs Sundsøen et meget stort botanisk potentiale til at indeholde en artsrig rigkærsvegetation med forekomst af artsrige lysåbne kildevæld samt tillige en mere almindelig, lavtvoksende engvegetation. Det nuværende græsningstryk kan dog ikke skabe disse forhold.

Det foreslås at gennemføre en slåning forud for græsningssæsonen fx i februar for at fjerne det visne plantemateriale som især i området med dominans af kær-star hober sig op og lukker af for lys til jordbunden.

Det kan desuden vise sig at være nødvendigt at supplere græsningen med en slåning af dele af engene omkring 1. juli og fjerne det afslåede materiale. Desuden er det vigtigt at holde området lysåbent ved at fjerne opvæksten af træer og buske. En sådan pleje skaber tillige ynglemuligheder for viben, der tidligere har ynglet på engene med flere par.

På "overdrevsknolden" kan der tyndes lidt ud i hvidtjørnene.